PRUNUS maritima racemoſa, folio rotundo glabro; fructu minore purpureo. Hiſt. Jam. Vol. II. p. 129.

The Mangrove Grape Tree.

THE Trunks of theſe Trees are frequently two Feet thick, and ſeldom aſpire above the Height of twenty or twenty-five Feet, the Bark is ſmooth, and of a brown Colour, the Leaves are ſet alternately, they are thick, broad, and almoſt round; and are eight, and ſome ten Inches Diameter: their middle Ribs are large and of a purple Colour, as are the ſmaller Veins; below the Pedicles of the Leaves, the Stalks are ſurrounded with a thin Purple Skin, or Membrane, an Inch in Width. The Flower-Stalks are uſually ten Inches long, thick, ſucculent, and ſpongy, and riſe at the Pedicles of the Leaves, uſually ſtanding upright, theſe Stalks except about three Inches of their lower Parts are thick ſet to the End; with ſmall pentapetalous, greeniſh white Flowers, with yellow *Stamina:* Theſe Flowers are ſucceeded by Pear ſhaped Fruit, about the Bigneſs of Cherries, reſembling them alſo in the Conſiſtence of their Pulp, and ſmooth Skin, but are of a purple Colour, incloſing a roundiſh Shell, thinner than that of a Filbert, and pointed at one End, within which lies the Kernel, of a ſingular and pretty Form, being flat at one End, and conic at the other, divided by three deep Furrows. This Fruit has a refreſhing agreeable Taſte, and is eſteem'd very wholeſome, but if the Stone be kept long in the Mouth, it is violently aſtringent: I never ſaw any but what grew near the Sea. They are plentiful on many of the *Bahama* Iſlands, and in many other Countries between the Tropicks, but are no where to be found North or South of them: The Flower-ſtalk when the Fruit approaches to Ripeneſs, is ſhrunk, and much leſs than when the Bloſſoms were on it.

Dampier ſays the Wood of this Tree makes a ſtrong Fire, therefore uſed by the Privateers to harden the Steels of their Guns, when faulty.

LES troncs de ces arbres ont ordinairement deux pieds de diametre, & ne s'élevent gueres qu'à vingt ou vingt & cinq pieds; leur écorce eſt unie & brune, leurs feuilles ſont alternes, épaiſſes, larges, & preſque rondes, elles ont huit, & quelquefois dix pouces de diametre; la côte du milieu eſt groſſe & violette comme les autres petites veines; au deſſous des pedicules des feuilles les tiges ſont entourées d'une peau mince & violette large d'un pouce; les tiges des fleurs ont ordinairement huit pouces de long, elles ſont épaiſſes ſucculentes & ſpongieuſes, elles naiſſent à la queüe des feuilles, & ſont ordinairement toutes droites; ces tiges à trois pouces environ de leur naiſſance ſont entierement couvertes juſques à leur extremité de petites fleurs a cinq petales d'un blanc verdâtre, avec des étamines jaunes; il ſuccede à ces fleurs des fruits en forme de pois gros à peu pres comme une ceriſe, & leur reſſemblant par la conſiſtence de leur pulpe & de la liſſure de leur peau, mais elles ſont violettes & renferment une coque ronde, plus mince que celle des noiſettes, & pointue par un bout, dans laquelle ſe trouve le noyau dont la forme eſt jolie & ſinguliere, étant platte par un bout, conique par l'autre, & diviſée par trois ſillons profonds. Ce fruit eſt d'un goût rafraichiſſant & agréable, on le croit fort ſain, mais ſi on en garde long tems le noyau dans ſa bouche, il eſt fort aſtringent; je n'ai jamais vû de ces arbres que proche de la mer, il y en a un grand nombre dans pluſieurs des Iſles Bahama, *& partout entre les Tropiques, mais on n'en trouve point au delà, ni au nord, ni au ſud. La tige des fleurs ſe fanne, & ſe diminue, quand le fruit commence à meurir, & devient beaucoup plus petite, que lorſqu'elle étoit couverte de fleurs.* Dampier *dit que le bois de ces arbres fait un feu fort vif, & c'eſt pour cela, que les Armateurs s'en ſervent pour tremper l'acier de leurs fuſils, quand il n'eſt pas bon.*

PHALÆNA Caroliniana, minor; fulva, maculis nigris alba linea, pulchrè aſperſis. Pet. Gaz. Nat. Tab. III. Fig. 2.

Papillon de Nuit.

THIS Moth has a dusky white Body, with a few black Spots near the Head; the two upper Wings are yellow, each of which is croſſed by ſix white Lines, ſpotted with black; the two under Wings are red, with their lower Parts verged with black. Theſe Moths are found in *Carolina.*

LE corps de ce Papillon eſt d'un blanc obſcur, avec un petit nombre de taches noires vers la tête, les deux ailes ſuperieures ſont jaunes, & traverſées chacune de ſix lignes blanches, tachetées de noir; celles de deſſous ſont rouges, le bas en eſt bordé de noir. On trouve ces Papillons à la Caroline.